



CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT AU COURS DU PRELEVEMENT

Code : L1-IN01-CATINCID
Version : 01.00
Date d'application : 31/08/2011

Fiche d'instruction

Révision : 0

Page 1 sur 1

Incident ou Accident	Causes	Conduite à tenir
Malaise du patient qui reste conscient	Anxiété, jeûne, ...	Rassurer le patient. Arrêter le prélèvement et faire comprimer par le patient le point de prélèvement. Incliner le dossier du fauteuil ou du lit de manière à ce qu'il soit le plus allongé possible. Relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire. Eviter la perte de connaissance en retenant l'attention du patient. Si nécessaire, appeler un collègue sans laisser le patient seul. Noter l'incident dans le dossier de soins et sur la fiche de prélèvement s'il a été fait.
Hématome au point de ponction	Garrot trop serré, veine trop fine, piqûre hésitante..	Rassurer le patient. Compresser le point de prélèvement Poser une compresse alcoolisée
Malaise avec perte de connaissance du patient	Anxiété, jeûne, causes médicales...	Arrêter le prélèvement. Incliner le dossier du fauteuil ou du lit de manière à ce qu'il soit le plus allongé possible. Relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire. Appeler un médecin selon la procédure institutionnelle. <u>Remarque</u> : en cas de crise d'épilepsie, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le patient ne se blesse. Noter l'incident dans le dossier de soins et sur la fiche de prélèvement s'il a été fait.